Supplementary Table 1. Types of microorganisms isolated from blood cultures

	Bacterial species	Infection	Sepsis	Septic shock	Total
Gram-negative bacilli	*Enterobacter aerogenes*	-	1 (0.33)	1 (0.33)	2 (0.67)
	Enterobacter cloacae	-	2 (0.67)	1 (0.33)	3 (1.00)
	Escherichia coli	3 (1.00)	16 (5.33)	12 (4.00)	31 (10.33)
	Klebsiella pneumoniae	2 (0.67)	6 (2.00)	6 (2.00)	14 (4.67)
	Proteus mirabilis	1 (0.33)	2 (0.67)	2 (0.67)	5 (1.67)
	Pseudomonas aeruginosa	1 (0.33)	3 (1.00)	5 (1.67)	9 (3.00)
	Stenotrophomonas maltophilia	-	-	2 (0.67)	2 (0.67)
Gram-positive cocci	*Staphylococcus aureus*	-	4 (1.33)	4 (1.33)	8 (2.67)
	Staphylococcus epidermidis	-	2 (0.67)	2 (0.67)	4 (1.33)
	Staphylococcus haemolyticus	-	2 (0.67)	2 (0.67)	4 (1.33)
	Staphylococcus hominis	-	1 (0.33)	1 (0.33)	2 (0.67)
	Staphylococcus capitis	-	2 (0.67)	-	2 (0.67)
	Streptococcus agalactiae	1 (0.33)	1 (0.33)	1 (0.33)	3 (1.00)
	Streptococcus dysgalactiae	-	1 (0.33)	1 (0.33)	2 (0.67)
	Streptococcus pneumoniae	-	4 (1.33)	2 (0.67)	6 (2.00)
Polymicrobial	*Klebsiella pneumoniae* + *Escherichia coli*	-	-	1 (0.33)	1 (0.33)
	Pseudomonas aeruginosa + *Staphylococcus aureus*	-	1 (0.33)	-	1 (0.33)
Fungus	*Candida albicans*	-	1 (0.33)	2 (0.67)	3 (1.00)
Contamination		-	1 (0.33)	1 (0.33)	2 (0.67)
Total		8 (2.67)	50 (16.67)	46 (15.33)	104 (34.67)

Values are presented as number (%).